

# Rzeki karpackie - czysta Natura 2000

## Natura 2000 - europejska sieć

Jednym z największych zagrożeń dla europejskiej przyrody są inwazje biologiczne obcych gatunków. Podstawowym kryterium rozróżniającym gatunki rodzime i obce jest to, czy ich występowanie na danym obszarze jest wynikiem procesów naturalnych, czy skutkiem zamierzonych lub niezamierzonych działań człowieka. Gatunki obce, które po zajęciu nowych obszarów wywierają negatywny wpływ na rodzime gatunki, siedliska lub ekosystemy, nazywane są inwazyjnymi gatunkami obcymi. Inwazyjne gatunki roślin konkurują z rodzimymi gatunkami o nisze ekologiczne, światło czy wodę. Oprócz przyczyniania się do wymierania gatunków rodzimych, gatunki obce mogą całkowicie zmieniać strukturę cennych siedlisk, a nawet funkcjonowanie całych ekosystemów. Często gatunki te stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub powodują straty gospodarcze.

## Barszcz Sosnowskiego



fot. I. Hugo.org, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2447365>

Barszcz Sosnowskiego jest jedną z największych roślin zielnych na świecie. Jego pędy osiągają wysokość najczęściej 2–3 m, natomiast liście szerokość 100 cm i długość 120–160 cm. Gatunek pochodzi ze wschodniej części Kaukazu. Do Polski sprowadzony jako roślina paszowa. Wytwarza nawet 20 tys. nasion – większość z nich opada w pobliżu rośliny rodzicielskiej, są jednak również przenoszone na dalsze odległości przez zwierzęta, wiatr, wodę lub nieświadomie przez człowieka. Roślina ta wykazuje dużą tolerancję i łatwość przystosowania się do zmieniających warunków klimatycznych i siedliskowych. Dobrze radzi sobie na łąkach, obrzeżach pól i lasów, na siedliskach wzdłuż cieków wodnych, rowów i dróg, nieużytkach i opuszczonych terenach rolnych. Barszcz Sosnowskiego tworzy duże, gęste, jednogatunkowe skupienia. Rośliny te we wszystkich swoich częściach zawierają sok bogaty m.in. w związku z grupy furanokumaryn, które w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, powodują trudno gojące się poparzenia. Do poparzeń może dojść również na skutek przebywania w pobliżu roślin podczas upalnych dni, gdy wydzielane olejki unoszą się w powietrzu. Podobne zagrożenie stwarza barszcz Mantegazziego. Wielokrotne koszenie zapobiega wyjątkowo rozprzestrzenianiu się gatunku. Dla usunięcia roślin ze środowiska konieczne jest użycie środków chemicznych (aplikowanych bezpośrednio na powierzchnię roślin zamiast oprysków) bądź innych metod np. orka i talerzowanie lub przestonięcie terenu geowłókniną lub czarną folią, a następnie wprowadzenie roślinności rodzimej.


## Robinia akacja



fot. Radio Tonreg from Vienna, Austria – Robinia pseudoacacia\*Uploaded by Jacopo Werther, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25210761>

Robinia akacja pochodzi z Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzona została w z początkiem XVII wieku jako drzewo ozdobne, była sadzona w parkach, później także w lasach. Ma małe wymagania glebowe, lecz jest rośliną światłolubną. Gatunek o udowodnionym negatywnym wpływie na rodzimą bioróżnorodność. Wysusza podłoże

## Biała Tarnowska PLH120090



fot. T. Witk

W tym numerze biuletynu edukacyjnego przedstawimy obce, inwazyjne gatunki roślin, które zagrażają przyrodzie karpaccich dolin rzecznych, a przede wszystkim obszarowi Natura 2000 Biała Tarnowska PLH120090. W ramach ochrony tego obszaru zaplanowano inwentaryzację i usuwanie gatunków inwazyjnych na terenie całego obszaru.

w głębszych warstwach, natomiast wierzchnią warstwę wzbogaca w azot – w konsekwencji następuje rozwój roślinności azotolubnej (np. pokrzyw). Ponadto wykazuje działanie allelopatyczne – wydzielane substancje utrudniają wzrost innym roślinom. Drzewo to jest ważną rośliną miododajną, lecz kora, liście i nasiona robinii akacji są trujące dla ludzi i wielu zwierząt (szczególnie dla koni). Robinia jest gatunkiem trudnym do zwalczania. Stosowane metody to wycinanie, wykaszanie, obrączkowanie i wypalanie. Używane są także środki chemiczne podawane w różny sposób (opryski, wstrzykiwanie, smarowanie ściętych pni). Zalecane jest także sadzenie gatunków cieniodajnych (grab, lipa, dąb, jawor) po usunięciu robinii. Właściwsze wydaje się jednak stosowanie odwrotnej kolejności zabiegów – najpierw podsadzenie i uzyskanie zacieniającego podszytu, a następnie usuwanie robinii. Najczęściej zalecane jest stosowanie jednocześnie kilku metod z ponawianiem zabiegu w razie potrzeby.

Rdestowiec ostrokończysty to wieloletnia bylina pochodzenia wschodnioazjatyckiego o tęgich, pustych w środku łodygach osiągających do 3 m wysokości. Został sprowadzony z Japonii jako roślina ozdobna. Rozmnaża się przede wszystkim poprzez rozrost i fragmentację kłaczy, które szybko rosną i sięgają na odległość 5–7 m od rośliny macierzystej. Fragmenty kłaczy są przenoszone na znaczne odległości nieświadomie przez człowieka, wraz z transportem ziemi na cele prac budowlanych. Rdestowiec ostrokończysty wykazuje szerokie spektrum siedliskowe, toleruje wysoką temperaturę, suszę, zasolenie i okresowe wylewy wód. Przyczynia się do spadku bogactwa gatunkowego siedlisk tęgów, zarośli wierzbowych i ziołorośli nadrzecznych poprzez tworzenie zwartych, gęstych i rozległych jednogatunkowych skupisk. Szczątki roślin rozkładają się wolno, tworząc grubą warstwę utrudniającą kiełkowanie siewek gatunków rodzimych. Podobnym gatunkiem jest rdestowiec sachaliński. Ze względu na ogromne zdolności regeneracyjne rdestowców, samo wycinanie czy wykopywanie roślin przynosi efekty tylko w dłuższej perspektywie czasowej. Najskuteczniejszy sposób niszczenia rdestowca ostrokończystego to co najmniej dwuletnie zwalczanie przy użyciu przenikających do kłaczy herbicydów.

## Rdestowiec ostrokończysty



fot. Radio Tonreg from Vienna, Austria – Acer negundo\*Uploaded Jacopo Werther, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25210227>

## Klon jesionolistny



fol. Radio Tonreg from Vienna, Austria – *Acer negundo* \*Uploaded Jacopo Werther, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25210227>

(np. łęgów wierzbowo-topolowych), w ziołoroślach nadwodnych. Ze względu na szybkie tempo wzrostu młode osobniki i odrosty tworzą zwarte zakrzewienia, które utrudniają wzrost innych roślin. Liście zawierają kumarynę, która powoduje hamowanie kietkowania i wzrostu innych roślin. Pyłek ma właściwości alergenne. W ramach zwalczania tego gatunku stosuje się ścinanie dorosłych drzew u podstawy pnia i usuwanie odrostów.

Klon jesionolistny to drzewo pochodzenia północnoamerykańskiego dorastające w Polsce do ok. 20 m wysokości. Gatunek charakteryzuje się szeroką tolerancją na warunki środowiskowe oraz bardzo dużą produktywnością nasion. Owoce zwane skrzydlakami rozsiewają się z wiatrem nawet do kilkudziesięciu kilometrów, ale mogą być również przenoszone przez wodę, lub przy pomocy ptaków i gryzoni. Rozmnaża się także wegetatywnie poprzez odrosty korzeniowe i pędy, które ukorzeniają się przy kontakcie z podłożem. Często występuje na siedliskach nadrzecznych

## Niecierpek gruczołowy



fol. Udo Schmidt from Deutschland – *Impatiens glandulifera* Royle Uploaded by Amada44, CC BY-SA 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24356289>

doplyne. Ograniczanie liczebności populacji niecierpka odbywa się poprzez ręczne wyrwanie lub wykaszanie kwitnących okazów przed wydaniem owoców, czyli od maja do sierpnia.

Niecierpek gruczołowy pochodzi z zachodniej części Himalajów. Jest jedną z najwyższych w Europie roślin jednorocznych. Rozpowszechniony został jako roślina ozdobna i miododajna. Występuje masowo zwłaszcza na siedliskach wilgotnych (ziołorośla, łęgi, zarośla). Rozprzestrzenia się głównie wzdłuż rzek. Konkuruje z rodzimymi gatunkami o zapylacze, przez co pogarsza warunki dla zawiązywania owoców i nasion przez rodzime gatunki owadopylne. Ograniczanie liczebności populacji niecierpka odbywa się poprzez ręczne wyrwanie lub wykaszanie kwitnących okazów przed wydaniem owoców, czyli od maja do sierpnia.

## Kolczurka klapowana



fol. ru:User:VP, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46902351>

Może konkurować z gatunkami rodzimymi (w tym szczególnie w zbiorowiskach nadrzecznych). Zawiera substancje toksyczne dla człowieka i zwierząt. Dla zwalczania kolczurki stosuje się wyrwanie lub koszenie roślin przed wydaniem nasion oraz opryski lub smarowanie liści środkami chemicznymi.

Gatunek północnoamerykańskiego, samorozsiewającego się i szybko rosnącego, jednorocznego pnącza. Atrakcyjny wygląd kwiatów kolczurki oraz charakterystyczne owoce wzbudzają zainteresowanie ludzi i stanowią przyczynę skuteczności jej inwazji. Sprzyja temu również obfitość nasion oraz umiejętność samorozsiewania. Występuje powszechnie w zbiorowiskach naturalnych i półnaturalnych.

## Nawłóć późna



fol. Wouter Hagens – Own work, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547161>

Nawłóć późna to bylina kłaczowa o pędach wysokości 50–250 cm, lancetowatych liściach, kwitnąca na żółto w sierpniu i wrześniu. Przywieziona do Europy z Ameryki jako roślina ozdobna. Ma szeroki zakres tolerancji wobec warunków klimatycznych i siedliskowych. Jej nasiona rozsiewane są przez wiatr i zwierzęta. Rozmnaża się także wegetatywnie – poprzez kłacza. Występuje najczęściej na niekoszonych łąkach, w miejscach wilgotnych, na brzegach cieków i zbiorników wodnych, obrzeżach lasów, przydrożach, terenach kolejowych itp. Szczególnie łatwo kolonizuje tereny z naruszoną powierzchnią gleby. Podobnym gatunkiem jest nawłóć kanadyjska. Wszystkie gatunki nawłoci wytwarzają substancje, które wydzielane do gleby utrudniają wzrost rodzimym gatunkom roślin. Walka z nawłocią polega na koszeniu terenu 2–3 razy w roku przez kilka lat.

Wszystkie gatunki nawłoci wytwarzają substancje, które wydzielane do gleby utrudniają wzrost rodzimym gatunkom roślin. Walka z nawłocią polega na koszeniu terenu 2–3 razy w roku przez kilka lat.

Jest pnączem pochodzącym z Ameryki Północnej, tworzącym wąsy czepne o liściach przebarwiających się jesienią na czerwono. Rozmnaża się zarówno za pomocą ukorzeniających się pędów, jak i przez nasiona, które rozsiewają ptaki. Winobluszcz ma niewielkie wymagania glebowe, jest odporny na mróz, suszę i zanieczyszczenia powietrza, w związku z tym łatwo wkracza na nowe tereny. Tworzy zwarte tany lub porasta drzewa i krzewy – przez co może zagrażać gatunkom rodzimym i siedliskom przyrodniczym. Rozprzestrzenia się na terenach przekształconych, jak również w lasach i zaroślach, na brzegach rzek i jezior. Zwalczanie tego gatunku polega na regularnym koszeniu lub wykopywaniu młodych roślin.

## Winobluszcz pięciolistkowy



fol. Tasja – Own work, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4803654>

### Pamiętaj!

Rośliny inwazyjne powodują straty gospodarcze, zagrożenie dla zdrowia i zmniejszają bioróżnorodność.

Usuwanie roślin inwazyjnych jest czasochłonne i kosztowne, a możliwość stosowania w tym celu środków chemicznych jest ograniczona w pobliżu cieków wodnych.

Zwracaj uwagę na to, co uprawiasz we własnym ogrodzie – nie stosuj gatunków inwazyjnych, ogranicz gatunki obce na rzecz rodzimych.

Nie wyrzucaj materiału roślinnego nad rzekę - starannie usuwaj odpady roślinne i zagospodaruj zbędny materiał roślinny.



Rzeki Karpackie - czysta Natura 2000

[www.rzekikarpackie.fwie.pl](http://www.rzekikarpackie.fwie.pl)

Co tygodni do 31.12.2018  
nagrada w konkursie na:

[www.facebook.com/RzekiKarpackie](https://www.facebook.com/RzekiKarpackie)

Projekt objęty wsparciem merytorycznym:

RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Rzeszowie

